

Journal medicinsk abort.

Gynækolog Trine Kølby
Ny Vestergade 3, 1 sal
6000 Kolding
tlf 75532877

Navn:

Cpr:

Ultralyds scanning den/...../20..... viste intrauterin graviditet uge.....+.....

Patienten har fået

Mifegyne 200 mg den/...../20.....

Cytotec 0,2 mg (3 styk) den...../...../20.....

Til patienten.

Aborten starter typisk 4-6 timer efter at du har taget Cytotec. Du får menstruationslignende smerter og blødning.

Ved en medicinsk abort, aborterer du hjemme, husk at der altid skal være en voksen person til stede som kan hjælpe dig.

Se hele vejledningen om medicinsk abort på vores hjemmeside www.gyn.kolding.dk

Smertelindring:

Pamol tabletter 500 mg: to tabletter hver 6 time

ipren tabletter 200 mg: to tabletter hver 6 time (dog max 6 tabletter pr døgn)

Almindelige bivirkninger til cytotec er kvalme opkastning og diarre.

VED BEHOV FOR HJÆLP KONTAKT KLINIKKEN PÅ tlf 27741761
UDENFOR ÅBNINGSTID: KOLDING SYGEHUS GYN.AFD: på 76362439

07-01-2019 revideres Januar 2021