

UNDERSØGELSE FOR CELLEFORANDRINGER

Screening for livmoderhalskræft

Hvis din celleprøve har givet mistanke om celleforandringer, eller du har oplevet kontaktblødning (blødning efter samleje) vil din læge sende dig videre til en gynækolog, til ekstra undersøgelser og evt. behandling.

Celleforandringer er ikke kræft, og stort set alle kvinder, der får konstateret celleforandringer, bliver helbredt.

Celleforandringer opstår på baggrund af en infektion med HPV virus. Både celleforandringer og virusinfektion er oftest symptomløse. Hvis kroppen ikke selv fjerner virusinfektionen, og celleforandringerne ikke opdages, kan disse i værste fald udvikle sig til livmoderhalskræft. Derfor anbefales du yderligere undersøgelser og eventuelt behandling af celleforandringerne.

Undersøgelsen består af en kikkertundersøgelse, af livmoderhalsen (kolposcopi), små vævsprøver (biopsier) og et lille skrab (cervixskrab). Der bliver lagt en lille lokalbedøvelse på livmoderhalsen inden prøven tages.

Efter undersøgelsen kan det bløde en lille uges tid. Blødningen må ikke overstige en menstruation, og den skal aftage dag for dag. Indtil blødningen ophører, bør Du ikke bruge tampon, tage karbad, gå i svømmehal eller havbad. Ved samleje anbefales kondom. Hvis Du efter undersøgelsen oplever kraftig blødning, ildelugtende udflåd eller feber, bør du kontakte klinikken, din egen læge eller lægevagten.

Der går ca. 2 uger inden der er svar på prøverne. Vi svare dig via mail, og hvis der går mere end 14 dage bedes du kontakte os.

Celleforandringerne inddeles i fire grupper: lette, middelsvære, svære og carcinoma in situ, som alle er forstadier til kræft. Når vi kender sværhedsgraden af celleforandringerne, tilbydes du enten en kegleoperation eller en ny kontrol.

Behandling

ved lette celleforandringer forsvinder disse af sig selv i løbet af 6-12 måneder hos 80 procent af kvinderne, Derfor er der ingen grund til at behandle dig her og nu, men kontrollere dig på ny efter 12 måneder.

Ved moderate celleforandringer kan man hos yngre kvinder, som ønsker at bevare livmoderhalsen, planlægge kontrol med nye vævsprøver efter 6 måneder. Undersøgelser har vist, at der er en lille risiko for, at føde for tidligt efter en kegleoperation.

Ved moderate , svære og udtalte celleforandringer hos alle andre kvinder, tilrådes man en kegleoperation. Ved indgrebet udskæres en lille kegle, som medinddrager celleforandringerne på livmoderhalsen. Operationen kan foretages her på klinikken i lokalbedøvelse.

Hvert år får omkring 6000 danske kvinder foretaget en kegleoperation.

Vaccination

Piger fra 12 års alderen tilbydes gratis vaccination med Gardasil 9 mod livmoderhalskræft.

Trine Kølby

September 2024 Revideres september 2027